

# Ofödda och späda barn



# Färre barn ska födas med skador orsakade av ANDT

och de barn som fått skador behöver stöd...

- Rapport 2014

# Hur vanligt är FAS?

Sann prevalens okänd

Uppskattas till 2–7 fall av 1000 födda i USA

(May m.fl., 2009)

Olegård 1979 – 2 barn med FAS på 1000 födda

Totalt i Socialstyrelsens register (MFR o PAR):

37 personer med FAS i Sverige 2001-2010

# Primära funktionsnedsättningar vid FASD

- Brister i
  - uthållighet
  - impulskontroll
  - exekutiva funktioner
  - kognitiv funktion
- Hyperaktivitet
- Uppmärksamhetssvårigheter
- Svårigheter att
  - följa instruktioner
  - kontrollera aggressivitet
  - bearbeta information

# Sekundära funktionshinder vid FASD

- Psykisk ohälsa (94 %)  
(psykisk sjukdom, depression, självmordstankar )
- Avbruten skolgång (43 %)
- Dåliga arbetslivserfarenheter (80 %)
- Missbruksproblematik (30 %)
- Kriminalitet (42 %)
- Olämpligt sexuellt beteende (45 %)
- Klarar inte eget boende (80 %)

- Den största enskilda riskfaktorn för sekundära funktionshinder är att diagnosen sätts sent.
- Sämre prognos för FASD-barn än för FAS-barn

# Vad görs i våra grannländer?

## Danmark:

- Familjeambulatorier i alla fem regioner
- Finansieras över statsbudgeten de fyra första åren
- Uppföljning till skolålder

## Norge:

2005 Social- og helsedirektoratets rapport  
Alkohol og graviditet

2013 Regionalt kompetenscenter för barn m  
FASD. Utredning, diagnostik o stöd- o  
behandlingsplanering